



Überweisungsschein für Laboratoriums- untersuchungen als Auftragsleistung

☐ Kurativ ☐ Präventiv ☐ bei belegärztl. Behandlung ☐ Unfall, Unfallfolgen

Auftragsnummer des Labors

Hier bitte sorgfältig
Barcode-Etikett einkleben!

Knappschafts-
kennziffer

Quartal

Q J J

Geschlecht

☐ Kontrolluntersuchung
bekannte Infektion

Behandlung gemäß ☐ § 116b SGB V ☐ eingeschränkter Leistungsanspruch gemäß § 16 Abs. 3a SGB V

☐ Empfängnisregelung, Sterilisation, Schwangerschaftsabbruch

Abnahmedatum

Abnahmezeit

T T M M J J

h h m m

SSW

Krankenkasse bzw. Kostenträger		
Name, Vorname des Versicherten		
geb. am		
Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum

Eintrag nur bei Weiterüberweisung!

Betriebsstätten-Nr. des Erstveranlassers	Arzt-Nr. des Erstveranlassers
--	-------------------------------

☐ Befund eilt, Übermittlung an ☐ Telefon ☐ Fax Nr. _____

Diagnose/Verdachtsdiagnose

Befund/Medikation

Auftrag

Vertragsarztstempel / Unterschrift überw. Arzt

Nicht zu verwenden bei Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und Schülerunfällen

Muster 10 (10.0000)

Mikrobiologie

Bitte entsprechendes Material und Untersuchung ankreuzen oder ergänzen:

Urin

path. Erreger ggf. Resistenz

- ☐ Mittelstrahlurin
☐ Dauerkatheterurin
☐ Einmalkatheterurin
☐ Blasenpunktionsurin
☐ Eintauchnährboden
☐ _____

Sonstige Untersuchungen:

- ☐ Pilze
☐ _____

Urogenitaltrakt

path. Erreger ggf. Resistenz

- ☐ Vaginalabstrich
☐ Cervixabstrich
☐ Vulvaabstrich
☐ Urethralabstrich
☐ Penisabstrich
☐ Ejakulat
☐ Analabstrich
☐ Erststrahlurin
☐ _____

Sonstige Untersuchungen:

- ☐ Pilze
☐ B-Streptokokken
☐ N. gonorrhoeae (Kultur + Resistenz)
☐ Mykoplasmen
☐ Ureaplasmen-PCR

Sexuell übertragbare Erreger (STD)

- ☐ STD-PCR **
☐ STD-GU (genitale Ulzera-PCR) */**
☐ MPox-Viren-PCR
☐ _____

Wunde/Haut/Punktat/Blutkultur

path. Erreger ggf. Resistenz

Entnahmeort

- ☐ Hautabstrich
☐ Wundabstrich
☐ Abstrich Abszess
☐ Gewebe
☐ Gelenkpunktat
☐ Blutkultur
☐ _____

Sonstige Untersuchungen:

- ☐ Pilze
☐ _____

Respirationstrakt

path. Erreger ggf. Resistenz

- ☐ Mundhöhle / Gaumenabstrich
☐ Rachenabstrich
☐ Tonsillenabstrich
☐ Nasenabstrich
☐ Ohrabstrich
☐ Bindehautabstrich
☐ Nasennebenhöhlensekret
☐ Sputum

- ☐ Tracheobronchialsekret
☐ BAL
☐ _____

Sonstige Untersuchungen:

- ☐ Multiplex-PCR-Viren **
☐ Multiplex-PCR-Bakterien **
☐ SARS-CoV-2-PCR
☐ Multiplex-PCR-Viren
☐ STD-PCR **
☐ Pilze

TBC-Diagnostik

Material:

- ☐ Erstdiagnostik (PCR + Kultur)
☐ Folgediagnostik (Kultur)

Gastrointestinaltrakt (Stuhl)

- ☐ path. Erreger ggf. Resistenz
☐ path. Erreger ggf. Resistenz (mit Reiseanamnese)
☐ Multiplex-PCR-Viren **
☐ Multiplex-PCR-Bakterien **
☐ Multiplex-PCR-Parasiten **
☐ EHEC(stx1/2)-PCR/Ag.
☐ Hepatitis E-PCR
☐ Clostridioides difficile
☐ Wurmeier (Mikroskopie)
☐ Giardia lamblia-Ag.
☐ Cryptosporidien-Ag.
☐ Amöben-Ag.

- ☐ Calprotectin
☐ Pankreas-Elastase
☐ Lactoferrin
☐ _____

Helicobacter pylori

- ☐ H. pylori-Ag. (Stuhl)
☐ Kultur + Resi. (Magenbiopsat)
☐ H. pylori-PCR * (inkl. Clarithromycin u. Levofloxacin-Resistenz)
☐ _____

Screening:

- ☐ MRSA/MSSA
☐ MRSA (Dekolonisation)
☐ MRGN
☐ VRE
☐ β -häm.-Streptokokken
☐ PVL-PCR *

Abstrichlokalisation:

- ☐ _____

Dermatomykosen

Kultur + Mikroskopie

- ☐ Hautschuppen
☐ Haarwurzeln
☐ Nagelspäne
☐ _____

Untersuchungen:

- ☐ Dermatophyten-PCR *
☐ _____

* nur Igel-Leistung

** nähere Information zu den Multiplex-PCR-Panel (Erregerlisten) siehe Rückseite

0472 FO-Bak-Schein V2 20251106



0021 0559 01

Multiplex-PCR (respiratorisch / gastrointestinal / STD)

* nur IGel Leistung

Respi-Viren-Panel (RIDVI)
Influenza A Influenza B Respiratory Syncytial Virus (RSV) Parainfluenza 1-4 humanes Metapneumovirus (hMPV) humanes Rhinovirus Adenovirus
Respi-Bakterien-Panel (RIDBA)
Bordetella pertussis Bordetella parapertussis Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae Legionella pneumophila Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae
STD-Panel (STD)
Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrhoeae Trichomonas vaginalis Mycoplasma genitalium Herpes simplex Virus Typ-1/-2 <u>Zusätzliche nicht-typische STD-Erreger:</u> Mycoplasma hominis Ureaplasma urealyticum Ureaplasma parvum

Gastro-Viren-Panel (GIDVI)
Norovirus [GG1] Norovirus [GG2] Adenovirus Rotavirus humanes Astrovirus Sapovirus
Gastro-Bakterien-Panel (GIDBA)
Campylobacter spp. Salmonella spp. Shigella spp. / EIEC Yersinia enterocolitica EHEC [stx1/2] Escherichia coli [O157]
Gastro-Parasiten-Panel (GIDPA)
Cryptosporidium spp. Giardia duodenalis Entamoeba histolytica
GU-Panel (STDGU)*
Herpes simplex Virus Typ-1/-2 Varizella Zoster Virus Cytomegalievirus Treponema pallidum Haemophilus ducreyi C. trachomatis (<i>Lymphogranuloma venereum</i>)

Hinweise und Präanalytik

Abstrich / Tupferart	trocken (ohne Transportmedium/Gel): PCR-Untersuchung für bakterielle, virale und parasitäre Erreger (s.o.) feucht (mit Transportmedium/Gel): für kulturelle Bakterien- u. Pilze-Nachweise (nicht für Dermatophyten**), bakterielle Resistenztestung, MRSA-MRE Screening, Gonokokken und B-Streptokokken Screening)
Wunden / Gewebe	bei V.a. Wundinfektion Gewebeprobe nach Debridement empfohlen, alternativ tiefer Abstrich von Wundrandgebieten aus verschiedenen Lokalisationen; bei chron. Wunden mind. 1X Screening auf MRE zum Ausschluss einer Besiedlung mit multiresistenten Erregern (MRSA / MRGN)
Urin	- sauberer Mittelstrahlurin für Erregeranzucht und Resistenztestung (Materialgewinnung / Abnahmetechnik beachten) - Gebrauch von Objektträgerkulturen („Urikulte“) nur in Ausnahmefällen - Erststrahlurin für STD-PCR ***/Chlamydia trachomatis
Dermatophyten**	- Onychomykose: mindestens 20 kleine Nagelspäne (bzw. 3mg) - Tinea capitis: mindestens 10 leicht epilierbare und makroskopisch auffällige Haare (mit Haarwurzel) - Dermatophytose: mindestens 10 Hautschuppen nativ
STD-PCR***	- Material (ja nach Sexualanamnese), Männer: Erststrahlurin; Abstrich (anal, pharyngeal, anal), Frauen: Abstrich (zervikal, anal, pharyngeal) - HINWEIS: kann als ein(e) PCR/Auftrag durchgeführt werden -; Ausnahme: HSV-PCR (Abstrich von Bläschen oder Vesikelflüssigkeit) - bei Kontrolluntersuchungen erforderlichen Abstand nach Abschluss der Therapie beachten (i.d.R. mind. 4 Wochen)
Lagerung	falls schnellstmöglicher Laborproben-transport nicht möglich sollten Proben aus dem ambulanten Bereich (Urin, Stuhl, resp. Materialien) i. d. R. im Kühlschrank (2-8°C) gelagert werden, Ausnahme: Gewebe, Punktate, Liquor, Blutkulturen, Nagel-Hautschuppen
Haltbarkeit	Haltbarkeitsdatum der Abstrichtupfers beachten (Gefahr von falsch negativen Befunden), Neueinsendung von Abstrichtupfern auf Nachfrage möglich

Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.diamedis.eu/ueber-uns/laborinformationen.html> oder sprechen Sie uns an (Tel: 05205/7299-0).